Fonction exponentielle.

Théorème 0.1 Il existe une **unique** fonction f , **dérivable** sur $\mathbb{R}$, telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a :

$$f'(x) = f(x) \quad \text{et} \quad f(0) = 1.$$

De plus pour tout $x \in \mathbb{R}$ $f(x) > 0$.

Définition 0.1 La fonction du théorème 1.1 est appelée fonction **exponentielle** et est notée :

$$\exp : x \rightarrow \exp(x).$$

1 Propriétés algébriques de la fonction exponentielle.

Proposition 1.1 Pour tout $a \in \mathbb{R}$ et pour tout $b \in \mathbb{R}$ on a :

$$\exp(a + b) = \exp(a) \times \exp(b).$$

Démonstration :

Proposition 1.2 Pour tout $a \in \mathbb{R}$ et pour tout $b \in \mathbb{R}$ on a :

$$\exp(a - b) = \frac{\exp(a)}{\exp(b)} \quad \exp(-a) = \frac{1}{\exp(a)}$$

Démonstration :

Proposition 1.3 Pour tout $a \in \mathbb{R}$ et pour tout $n \in \mathbb{Z}$ on a :

$$\exp(n \times a) = \left[\exp(a) \right]^n.$$

Démonstration par **récurrence** :

1.1 Nouvelle notation de la fonction exponentielle.

Remarque(s) 1.1

$$e^0 = 1$$

$$e^1 = e$$

$$e^{-1} = \frac{1}{e}$$

$$e^{a+b} = e^a \times e^b$$

$$e^{-a} = \frac{1}{e^a}$$

$$e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$$

Savoir-faire 1.1 ① Exprimer en fonction du nombre e chacun des nombre suivants :

$$A = \exp(-2)$$

$$B = \exp(0.8) \exp(1) \exp(1.2)$$

$$C = \frac{\exp(1,23)}{\exp(0,23)}$$

② Simplifier chacune des expressions suivantes :

$$D = \frac{e^{1,5}}{e}$$

$$E = (e^{0,5})^4 \times e^{-1}$$

$$F = (e^x \times e^{-x})^2$$

$$G = \left(\frac{e^{1+0,25x}}{e^{1-0,25x}} \right)^2$$

2 Etude de la fonction exponentielle.

2.1 variations de $x \rightarrow e^x$.

Théorème 2.1 1. La fonction exponentielle est *strictement positive*.
2. La fonction exponentielle est *dérivable et continue* sur $\mathbb{R}$.
3. La fonction exponentielle est *strictement croissante* sur $\mathbb{R}$.

DEMONSTRATION :

Pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $\exp'(x) = \exp(x)$ or nous savons que pour tout $x \in \mathbb{R}$ $\exp(x) > 0$. Donc la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

2.2 Limites à l'infini.

Théorème 2.2

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \qquad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0.$$

Démonstration : Démonstration à savoir refaire(ROC)

2.3 Courbe représentative de $x \rightarrow e^x$.

3 Croissance comparée de e^x et x .

Théorème 3.1 Nous avons les limites suivantes :

1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty.$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x \times e^x = 0.$$

3.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

DEMONSTRATION :

4 Etude d'une fonction contenant e^x .

Savoir-faire 4.1 *Factorisation d'une expression comportant des exponentielles. factoriser au possible chacune des expressions suivantes.*

$$f(x) = e^{2x} + e^x$$

$$g(x) = xe^x + 3e^x$$

$$h(x) = xe^{2x} + xe^x$$

Savoir-faire 4.2 *Dériver une fonction faisant intervenir la fonction exponentielle.*

Dériver chaque fonction sur $\mathbb{R}$.

$$g(x) = 1 + 2x + 3e^x$$

$$(1 + x) \times e^x$$

$$l(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}$$

5 Résolution des équations de la forme $e^{f(x)} = e^{g(x)}$.

Théorème 5.1 *Soit A et B deux nombres réels.*

L'équation $e^A = e^B$ équivaut à $A = B$.

Exemple(s) 5.1 — Résoudre l'équation $e^{2x} = e^{-3x+1}$.

— Résoudre l'équation $e^{2x+1} = 1$ indication ($e^0 = 1$).

6 Résolution d'inéquations de la forme $e^{f(x)} < e^{g(x)}$.

Théorème 6.1 Soit A et B deux nombres réels.

L'inéquation $e^A \leq e^B$ équivaut à $A \leq B$.

Exemple(s) 6.1 — Résoudre l'inéquation $e^x > e^{-2x+1}$.

— Résoudre l'inéquation $e^{-x+3} \geq 1$ indication ($e^0 = 1$).

Exemple(s) 6.2 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} - \{-1\}$ par $f(x) = x \times e^x$.

1. Calculons $f'(x)$ et factorisons de $f'(x)$.

2. Etude du signe de $f'(x)$.

	x
	Signe de e^x
	Signe de $(x+1)$
3.	Signe de $f'(x)$
	Variations de f

4. Voici $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f , elle permet de confirmer nos calculs.

7 Fonction $x \rightarrow (\exp \circ u)(x) = e^{u(x)}$.

Definition 7.1 Soit u une fonction définie sur un intervalle I alors la fonction $f = e^u$ est la fonction définie sur I par :

$$f(x) = e^{u(x)}.$$

Théorème 7.1 Soit u une fonction *dérivable* sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, la fonction définie sur I par $f(x) = \exp[u(x)] = e^{u(x)}$ est *dérivable* sur I et pour tout réel $x \in I$ on a :

$$f'(x) = u'(x) \times e^{u(x)}.$$

Exemple(s) 7.1 Dériver chaque fonction sur l'intervalle I donné.

$$f(x) = e^{-0,5x} \quad I = \mathbb{R}$$

$$g(x) = x + e^{-3x} \quad I = \mathbb{R}$$

$$h(x) = e^{x^2} \quad I = \mathbb{R}$$

Savoir-faire 7.1 Une fonction importante pour les probabilités !

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} - \{1\}$ par $f(x) = e^{-x^2}$.

1. Calculons $f'(x)$.
2. Etude du signe de $f'(x)$, variations de f .

x	
Signe de e^{x^2}	
Signe de $-2x$	
Signe de $f'(x)$	
Variations de f	

3. Voici $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f , elle permet de confirmer nos calculs.

8 Fonctions $x \rightarrow e^{u(x)}$ particulières.

8.1 Fonctions $f_k : x \rightarrow e^{-kx}$ avec $k > 0$.

1. Les fonctions f_k sont dérivables sur $\mathbb{R}$ puisque elles sont les composées de la fonction $x \rightarrow \exp(x)$ et des fonctions affines $x \rightarrow kx$ qui sont dérivables sur $\mathbb{R}$.
Calculons $f'_k(x)$.

$$f'_k(x) = -ke^{-kx} < 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Donc les fonctions f_k sont strictement décroissantes sur $\mathbb{R}$.

2. On a pour tout $k \in]0; +\infty[$ d'après le théorème de composition des limites.

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -\infty} (-kx) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-kx} = +\infty.$$

On a aussi pour tout $k \in]0; +\infty[$ d'après le théorème de composition des limites.

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} (-kx) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-kx} = 0.$$

3. Les courbes C_{f_k} admettent l'axe des abscisses comme asymptote en $+\infty$.
4. Représentation graphique de $f_{0.5}$, f_1 , f_3 .

8.2 Courbes de Gauss, Fonctions $g_\alpha : x \rightarrow e^{-\alpha x^2}$ avec $\alpha > 0$.

1. Les fonctions g_α sont dérivables sur $\mathbb{R}$ puisque elles sont les composées de la fonction $x \rightarrow \exp(x)$ et des fonctions $x \rightarrow -\alpha x^2$ qui sont dérivables sur $\mathbb{R}$.
Calculons $g'_\alpha(x)$.

$$g'_\alpha(x) = -2\alpha x e^{-\alpha x^2} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Puisque $e^{-\alpha x^2} > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, le nombre dérivé $g'_\alpha(x)$ est du signe de $-2\alpha x$. Donc g_α est strictement croissante sur $] -\infty; 0]$ et strictement décroissante sur $[0; +\infty[$.

2. On a pour tout $\alpha \in]0; +\infty[$ d'après le théorème de composition des limites.

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -\infty} (-\alpha x^2) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-\alpha x^2} = 0.$$

On a aussi pour tout $\alpha \in]0; +\infty[$ d'après le théorème de composition des limites.

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} (-\alpha x^2) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-\alpha x^2} = 0.$$

3. Les courbes $\mathcal{C}_{g_\alpha}$ admettent l'axe des abscisses comme asymptote en $+\infty$ et en $-\infty$.
4. Représentation graphique de $g_{0.5}$, g_1 , g_3 .

5. Pour tout $\alpha > 0$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $0 < g_\alpha^{-1}(x) \leq 1$.